



ФЛУВАЛІСАН

(смужки)

листівка-вкладка

Опис

Смужки полімерні світло-жовті зі специфічним запахом.

Склад

1 смужка містить діючу речовину:
флувалінат (тау-флювалінат) - 40 мг.
Допоміжні речовини: поліхлорвінілова стрічка (носій).

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QP53 Ектопаразитициди, інсектициди і репеленти. QP53AC10 Флувалінат

Флувалінат (тау-флювалінат) - інсектоакарицид з контактним акарицидним ефектом проти кліщів *Varroa destructor* (в Європі до 2000 року вважали *Varroa jacobsoni*) малотоксичний для бджіл *Apis mellifera*, маток та бджолиного розплоду.

Флувалінат є високоефективною селективною речовиною, яка діє як отрута на нервову систему кліща, призводячи його до швидкої загибелі. Механізм дії флувалінату полягає в блокуванні передачі нервових імпульсів, що викликає порушення координації рухів, параліч і загибель кліщів.

Застосування

Для лікування бджіл (бджолосімей), хворих на варроатоз.

Смужки препарату ФЛУВАЛІСАН розташовують в міжрамочному просторі у вулику в центральній зоні бджолиного гнізда так, щоб бджоли могли переміщатися по ньому з обох сторін рамок та залишають на термін від 7 до 10 діб, після чого виймають та утилізують, повторюють 3-4 рази. В залежності від тяжкості ураження кліщами варроа обробку проводять до 30-35 днів. Для отримання найбільшого лікувального ефекту бджолосім'ї обробляють в безрозплідний період (восени, або навесні) або після видалення з них розплоду в сім'ї-інкубатори. З метою виключення забруднення товарного меду обробку закінчують за 30-45 днів до початку головного медозбору.

Дозування

Для обробки сильних бджолиних сімей препарат застосовують з розрахунку 1 (одна) смужка на 10 рамок. Для слабких сімей використовують тільки 1/2 смужки. Дозування можна збільшити або зменшити в залежності від стану медоносної бджоли.

Протипоказання

Підвищена чутливість до тау-флювалінату. Не використовувати під час медозбору.

Застереження

Не застосовувати одночасно з іншими акарицидами та засобами захисту бджіл.

Перед обробкою рекомендується провести відповідне тестування (наприклад тест Beltsville), щоб визначити наявність стійкості кліщів до препарату. Якщо неможливо провести тестування, рекомендується спостерігати за падінням кліщів до та після введення препарату, щоб визначити ефективність обробки.

Перед масштабним застосуванням препарату слід випробувати його дію на 1-2 бджолиних сім'ях.

При роботі з препаратом необхідно виконувати правила особистої гігієни та техніки безпеки, передбачені при роботі з ветеринарними препаратами. Препарат може викликати подразнення шкіри, і є токсичним для тутового шовкопряда та гідробіонтів. Одягайте захисні рукавички при роботі зі смужками. Необхідно уникати контакту препарату зі шкірою та слизовими оболонками. Під час використання препарату забороняється курити, пити та їсти. Ретельно мийте руки водою з милом після контакту зі смужками.

Смужки придатні лише для одноразового використання. Використані смужки повинні бути зібрані і знищені.

Форма випуску

По 4, 8, 10 або 20 смужок в упаковці з ламінованої полімерної плівки.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце, в щільно закритому упакованні виробника, окремо від продуктів бджільництва та інших засобів захисту бджіл за температури від 0 до 25 °C.

Термін придатності - 4 роки.

Власник реєстраційного посвідчення:

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»
вул. Васильківська, 16, Київ, 03040, Україна
тел: +380800211201,
E-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua;
www.ukrzoovet.com.ua

Виробники готового продукту:

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»
вул. Васильківська, 16, Київ, 03040, Україна
тел: +380800211201,
E-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua;
www.ukrzoovet.com.ua

Шанксі Веіпенг Фармацевтікал Кою., Лтд.
№ 17, дорога Хоуань, Район Південного аеропорту,
Зона економічного та технологічного розвитку Юньчен,
місто Юньчен, провінція Шанксі, Китай

А Лише для
ветеринарної
медицини

